



- A. Se juntan las yemas de los dedos y se intenta reproducir el movimiento del pico de las aves. Suele ser utilizado con otras expresiones fijas como: "habla como un loro".

Frase n.º: .....

- B. Se pone la palma de la mano hacia abajo con los dedos juntos y el pulgar a una altura por debajo. La mano se suele mover de izquierda a derecha en un gesto repetitivo por debajo de la nariz.

Frase n.º: .....



- C. El hablante se da pequeños golpes en la mejilla con el dorso de la mano.

Frase n.º: .....

## > 5 De las siguientes frases subraya la perífrasis más adecuada según el contexto y la intención comunicativa.

1. Apenas comenzó la función de Los Morancos, el público **acabó de reír/se echó a reír** y no paró hasta el final. Para mí son los mejores cómicos de España.
2. Umm... de Barcelona a Ávila son unas siete horas de coche, así que **vienen a ser/llevan siendo** unos 700 kilómetros más o menos.
3. **Acabo intentando/Llevo intentando** aprender chino más de diez años y es imposible, no entiendo ni una conversación de bar, voy perdido como el primer día, no me entero de nada.
4. Sí, los alumnos **vienen a progresar/van progresando** adecuadamente y hemos bajado la tasa de repetidores con respecto al año pasado. Estamos muy contentos con los resultados académicos.
5. Para bajar de peso lo primero que hice fue **dejar de comer/acabar de comer** pan, y no veas lo que he sufrido... Para mí el pan es sagrado.
6. Siempre que voy a comprar con mi marido me boicotea todas las compras... Me dice que es muy caro, que ya tenemos de eso en la casa, que para qué quiero eso... Al final **acaba por fastidiarme/lleva fastidiadas** todas las compras, por eso voy sola y me lo paso la mar de bien.
7. **Lleva trabajando de/se metió a** carnicero desde que cerró el supermercado y se montó su propio puesto en el mercado, hace varios años y le va muy bien.
8. **Acabo de ver/Estoy viendo** el último capítulo de *Glee* y ya tengo ganas de ver uno más. Fue el mejor capítulo de toda la temporada.

## > 6 Clasifica las perífrasis anteriores de acuerdo a lo que expresan.

1. Expresa el fin de una acción habitual: .....
2. Expresa un valor de aproximación: .....
3. Indica el progreso gradual de una acción: .....
4. Indica el comienzo repentino de una acción: .....
5. Expresa que un suceso continúa desde su comienzo hasta el momento actual: .....
6. Indica el final reciente de un suceso: .....
7. Indica la culminación de un proceso: .....

reproducir el movimiento del pico de las aves como: "habla como un loro".



una altura  
ativo por

el dorso de la mano.

la intención comunicativa.

chó a reír y no paró hasta el

arillevan siendo unos 700

imposible, no entiendo ni una

bajado la tasa de repetido-

pa, y no veas lo que he su-

que es muy caro, que ya

ame/lleva fastidiadas

montó su propio puesto

o más. Fue el mejor capi-

7 Identifica en cuáles de los siguientes enunciados hay perífrasis y sustitúyelas por otras estructuras verbales no perífrásticas sin que pierdan el sentido original.

1. Llevo ahorrados unos 500 euros para el viaje, ¿será suficiente?
2. ¡Cómo tardal! Parece que viene caminando desde Madrid.
3. Los médicos están estudiando las posibilidades de una nueva intervención.
4. Les dijeron que no pasarían el examen y ahora se ponen a estudiar como locos.
5. Tengo rotas las gafas desde hace dos días y no tengo tiempo para ir a la óptica.
6. Son las cinco, no llega a coger el vuelo, es demasiado tarde.
7. He dejado de conectarme al Facebook, me paso demasiadas horas enfrente del ordenador y me da la sensación de que estoy perdiendo mi privacidad.

## ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE LE

### PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA Y USO DE LA LENGUA

8 Lea el siguiente prospecto de un medicamento y conteste a las preguntas (1-6). Seleccione la opción correcta (A, B o C).

**PRESENTACIÓN**  
Cápsulas de 5 mg.  
Comprimitidos de 50 mg.  
Sobres 2,5 mg.  
Vial 20 50 100 mg.  
**COMPOSICIÓN POR UNIDAD**  
clorazepato dipotásico 5 mg.  
potasio, sales (excipiente)

**PROSPECTO**

**INDICACIONES**  
Neurosis (de ansiedad, fóbica, histérica). Insomnio.

**POSOLÓGIA**  
**Oral**  
Adultos: 5-15 mg/6-12 h o 15 mg/24 h, al acostarse, pudiendo aumentarse la dosis diaria, en función de la respuesta clínica, hasta un máximo de 25 mg/6 h (100 mg/día).  
Ancianos y pacientes debilitados: 5 mg/8-24 h, hasta un máximo de 10 mg/6 h (40 mg/día).  
Niños: 0,25 mg/kg/12 h, hasta un máximo de 1 mg/kg/12 h (2 mg/kg/día).  
**Vía intramuscular o intravenosa**  
Adultos: 20 mg/8 h. En casos graves, pueden emplearse dosis de hasta 100 mg/8 h.  
**Nota:** en el tratamiento del insomnio deben evitarse los tratamientos superiores a dos o tres semanas, sugiriéndose el uso intermitente del fármaco durante este período.

**FARMACOCINÉTICA**  
Puede administrarse por vía oral o intramuscular. Cuando se administra en forma oral, el organismo absorbe rápidamente sus componentes. El clorazepato dipotásico se elimina mayoritariamente por la orina. La duración de la actividad farmacológica es de 40 h.

**ACCIÓN Y MECANISMO**  
Este ansiolítico pertenece a los llamados benzodiazepínicos y es de acción prolongada. Actúa incrementando la actividad sobre un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro, lo que produce un efecto hipnótico, sedante, relajante muscular y amnésico.

**CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES**  
Contraindicado en alergia a los medicamentos benzodiazepínicos, así como en pacientes con coma, shock o intoxicación etílica aguda. Deberá realizarse un especial control clínico en pacientes con historial de drogodependencia o insuficiencia respiratoria grave.  
Se recomienda un reajuste de la dosificación en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.  
El uso prolongado o dosis elevadas de este medicamento puede producir dependencia psíquica y física.  
No se aconseja la conducción de vehículos, ni el manejo de maquinaria peligrosa o de precisión durante el tratamiento.

**EFFECTOS ADVERSOS**  
Los efectos adversos de este medicamento son, en general, frecuentes y moderadamente importantes. El perfil toxicológico de este fármaco es similar al del resto de benzodiazepínicos.